


DDS Filippo Cardarelli

Odontoiatra

Specialista in Ortognatodonzia



Open Bite

Paziente di anni 2,5 open bite dentale da abitudine viziata (succhiamento protratto del ciuccio) abbinata ad alterazione della deglutizione. La malocclusione è caratterizzata da contrazione dell'arcata superiore associata ad open bite.

La sequenza terapeutica prevede i seguenti step :

- motivazione
- terapia elastodontica con ciuccio bite per 6 mesi
- Il Step con apparecchio Amcop Open per circa 12 mesi
- Controlli periodici durante la permuta










I Step con ciuccio bite





04/21



01/21



01/21




04/21

Il step

Il primo apparecchio elastodontico è riuscito a migliorare la malocclusione ed a ridurre l'open bite presente. A questo punto la terapia è proseguita con l'apparecchio *AMCOP Open* con piano di masticazione alto posteriore così da favorire il corretto sviluppo del mascellare con la conseguente chiusura dell'open bite; in questo caso la terapia elastodontica è stata associata a terapia miofunzionale al fine di rieducare la corretta postura della lingua.

Il caso finito verrà monitorato nel corso della crescita.







01/21



09/22



01/21



04/21



10/21



01/21



04/21



10/21



01/21



09/22



01/21




09/22

DDS Filippo



DDS Filippo Cardare

03/22



Conclusioni

L'open bite anteriore da abitudine viziata nella dentatura decidua può essere espressione di anomalie scheletriche sul piano trasversale e verticale; bisogna precisare che comunque non può essere classificato come open bite quello transitorio che compare durante l'eruzione degli incisivi **ma è anche vero che** in una percentuale di casi questi quadri clinici possono peggiorare con la crescita ancor più se presente una componente scheletrica ereditaria. L'utilizzo del protocollo elastodontico minimamente invasivo consente al clinico di iniziare a trattare queste malocclusioni molto precocemente evitando l'insorgenza di gravi disgnazie.